

# ለጽንሰ ማስወረድ አሠራር ሂደት - በመድሃኒት

## ሆነ ተብሎ እያወቁ ጽንሱን ለማቋረጥ ከፈለጉ በመድሃኒት ጽንሰን ማስወረድ አንደኛው መንገድ ነው

የመጀመሪያው እርምጃ ከሆኑም ጋር የህክምና ምክር ለማካሄድ ቀጠሮ ማቀናጀት ነው። እንዲሁም ነርስም ተሳታፊ ሊሆን ይችላል። በዚህ የምክር ጊዜ ላይ የጤና ባለሙያዎች የሚያደርጉት፡

- ይህ የአሠራር ሂደት ለርስዎ የሚስማማ ከሆነ ማሳወቅ
- በመድሃኒት ጽንሰን ስለማስወገድ አሠራር ሂደቱን መግለጽ
- በቤትዎ ውስጥ ድጋፍ እንዲያገኙ ስለሚደረግ ቅንጅት መወያየት
- በሂደቱ መሄድ ከወሰኑ አስፈላጊውን ዝግጅት ማድረግ፤ እንዲሁም የሚያስፈልግዎትን መድሃኒት ማዘገጥ ያካተተ
- በስምምነት መስጫ ቅጽ ላይ እንዲፈረሙ መስጠት።

በዚህ ወይም በሌላ ቀጠሮ ላይ አልተራሳውንድ እና የደም ምርመራ ሊያደርጉ ይችላሉ።

በመድሃኒት ማስወረዱ ላይ የሚቀጥሉበት ከሆነ፤ የአሠራር ሂደቱ እንደሚከተለው ይሆናል፡

- የመጀመሪያውን ኪኒን (ሚፊፕሪስቶን/mifepristone)፤ በኪ.ሊ.ኒክ ወይም በቤት ውስጥ መውሰድ። ሚፊፕሪስቶን/Mifepristone (ቀደም ሲል RU486 በሚል ይታወቃል) ይህም ለእርግዝና የሚረዳን ሆርሞን (ፕሮግስተሮን/progesterone) ተግባር በማገድ ጽንሱ እንዲቆም ያደርጋል።
- ሁለተኛውን ኪኒን (ሚሶፕሮስቶል/misoprostol) ከ24 እስከ 48 ሰዓታት ጊዜ በኋላ (በአብዛኛው በቤት ውስጥ) ይወስዳሉ። ሚሶፕሮስቶል/Misoprostol የማህጸን ጫፍ እንዲለሰልስ እና ማህጸን እንዲከማተር በማድረግ ጽንሱ እንዲወጣ ያደርጋል።
- ብዙጊዜ ጽንሰ ማስወረዱ የሚጠናቀቀው የሁለተኛ ኪኒን (ሚሶፕሮስቶል/misoprostol) ከወሰዱ በኋላ ከአራት እስከ ስድስት ሰዓታት ባለው ጊዜ ነው። ከዚያም በላይ ጊዜ ሊወስድ ይችላል።
- በአብዛኛው የአንድ ወይም የሁለት ቀን እረፍት ወይም እንቅስቃሴን መቀነስ ይኖርብዎታል።

## የጽንሰ ማስወረጃ መድሃኒት በሚወሰድበት ጊዜ

የሚሶፕሮስቶል/misoprostol ኪኒን ከወሰዱ በኋላ የሚከተሉት ችግሮች/ምልክቶች እንደሚያጋጥምዎ መጠበቅ ይችላሉ፡

- ማቅለሽለሽ፣ ማስታወክ፣ ተቆማጥ፣ መደንዘዝ፣ የራስ ምታት እና ትኩሳት (ይህ በሴቶች መካከል ይለያያል)
- በግማሽ ሰዓት ውስጥ የሆድ እቃ ህመም (በአብዛኛው ከወር አበባ ከሚከሰት ህመም ጠንክር ያለ) እና ከአንድ እስከ አራት ሰዓታት በኋላ መድማት (ከወር አበባ ከሚከሰት ደም ከበድ ያለ)። ለዚህ የሚወስደው ጊዜ ገደብ መገመት አይቻልም
- ብዙጊዜ ከሁለት እስከ ስድስት ሰዓታት ባለው ጊዜ የመድማቱ ደረጃ ወደነበረው የወር አበባ መጠን ለመረጋጋት በግምት፤ ሌላ አስራ ስድስት ሰዓታት የሚሆን ይወስዳል
- በመዳሀኒት ጽንሰ ማስወረድ ካካሄዱ በኋላ ያልታሰበ፤ መደበኛ ያልሆነ ወይም የመድማት ጊዜ መራዘም እስከ አራት ሳምንታት ሊቀጥል ይችላል።

## በመድሃኒት ጽንሱን ካሰወረዱ በኋላ

የጽንሰ ማስወረጃ መድሃኒት ከወሰዱ በኋላ የደም ምርመራ ማካሄድዎን ማረጋገጥና የአሠራር ሂደቱ ስለመጠናቀቁና ከዚህ በኋላ ጽንሰ እንደሌለ ለማረጋገጥና ለመከታተል ከርስዎ ህኪም ወይም ከሌኒክ ጋር ከሁለት እስከ ሶስት ሳምንታት ባለ ጊዜ የህክምና ቀጠሮ ማቀናጀት።

ጽንሱን ካሰወረዱ በኋላ በሳምንት ጊዜ ላይ ኢንፈክሽን ብክለትን ለመቀነስ፤ መደረግ የሌለበት፡

- በርስዎ ብልት ውስጥ ምንም ነገር አለማስገባት፤ ሞዴስንም ጭምር
- በብልት ወሲብ መፈጸም
- መድማቱ እስኪቆም ድረስ ማንኛውም የማፍታቻ አካል እንቅስቃሴ፤ ስፖርትን ወይም ከባድ የአካል ሥራን አለማድረግ
- ወደ ዋና መሄድ ወይም በገንዳ ውስጥ መዘፍዘፍ (ገላዎትን መታጠብ ይችላሉ)።

## በመድሃኒት ማስወረድ የሚከሰት የጎንዮሽ ጉዳትና ውስብስቦች

በመድሃኒት ማስወረጃ ከተወሰደ በኋላ የሚከሰቱ የጎንዮሽ ጉዳቶች፡

- ከማህጸን መሸማቀቅ ጋር የሚፈጠር ህመም
- ያልተገመተ፤ መደበኛ ያልሆነ ወይም ለረጅም ጊዜ መድማት
- ማቅለሽለሽ
- ማስታወክ።

በመድሃኒት ማስወረድ የሚከሰት የጤና ውስብስቦች ያልተለመዱ ናቸው፤ ነገር ግን ከዚህ የሚከተሉትን ሊያካትት ይችላል፡

የጤና ውስብስቦች	ምልክቶች	ህክምና
<p><b>የደም ስር መበጠስ /Haemorrhage</b> (በጣም ከባድ መድማት)</p> <p>በጥቂቶች ላይ ይከሰታል ከ1,000 ሴቶች ውስጥ በአንድ ሴት</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ከሁለት ሰዓታት በላይ የሚሆን ከሁለት ትላልቅ ሞዴስ በላይ በሰዓት ውስጥ በደም መሞላት</li> <li>• ትንሽ የሎሚ መጠን ያለው የደም መርጋት ማስተላለፍ</li> <li>• የድካም መንፈስ ወይም እራስን መሳት</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• በአስቸኳይ ለህክምና ትኩረት ይጠይቁ</li> <li>• ለአምቡላንስ በስልክ 000 መደወል ወይም በአቅራቢያዎ ወደሚገኝ ሆስፒታል የድንገተኛ ክፍል መሄድ (እራስዎ መኪና አይንዱ፤ ሌላ ሰው እንዲወስድዎ ያቀናጁ)</li> <li>• የሌላ ሰው ደም ልገሳ ያስፈልግ ይሆናል</li> </ul>
<p><b>ኢንፈክሽን ብክለት</b></p> <p>ከ100 ሴቶች ውስጥ በአንድ ሴት ይከሰታል</p>	<p>ሊከሰት የሚችል፡</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ህመም</li> <li>• ያልተለመደ በብልት ላይ ፈሳሽ መውጣት</li> <li>• ትኩሳት</li> <li>• ድካም</li> <li>• ተቅማጥ</li> <li>• ማስታወክ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• በአስቸኳይ ለህክምና ትኩረት ይጠይቁ</li> <li>• የርስዎን ክሊኒክ፣ አጠቃላይ ህኪም/GP ማየት ወይም የአንቲባዮቲክ ህክምና ለማግኘት ወዲያውኑ ወደ ሆስፒታል የድንገተኛ ክፍል መሄድ</li> </ul>
<p><b>ጽንሰ ሙሉ በሙሉ አለመውጣት</b></p> <p>ከ100 ሴቶች ውስጥ ከ2 እስከ 5 ሴቶች ላይ ይከሰታል</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• የአንዳንድ ህዋሳት በማህጸናቸው ውስጥ ስለሚቆይ ተከታታይ መድማት መከሰት</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• እነዚህን ለማስወገድ ክረኖችን መድገም ወይም ቀላል የቀዶ ጥገና አሠራር ሂደት ሊያስፈልግ ይችላል</li> </ul>
<p><b>የአሠራር ሂደት አለመሥራት</b></p> <p>ከ100 ሴቶች ውስጥ በ2 ሴቶች ላይ ይከሰታል</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ተከታታይ የሆነ የእርግዝና ምልክት ችግሮች እንደ ማቅለሽለሽና ማስታወክ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• የመድሃኒት ማስወረጃ ክረኖች በድጋሚ ሊወሰዱ ይችላሉ ወይም በቀዶ ጥገና ለማስወረድ ያስፈልግ ይሆናል*</li> </ul>

\* መድሃኒቱን ከወሰዱ በኋላ ጽንሰ ማስወረዱ ካልተካሄደ፤ በእርግዝናው ላይ እንዳይቀጥሉበት ይመከራሉ፤ ይህም በአንዳንድ ሁኔታዎች የተወሰዱት መድሃኒቶች የሽል/ጽንሰ- እድገት ላይ የተዛባ ቅርጽ እንዲኖር ምክንያት ስለሚሆን ነው።

## የሚከተሉት ካሉብዎ የህክምና እርዳታ ያስፈልግዎታል፡

- የሚሶፕሮስቶል/misoprostol (ሁለተኛውን ክረኖ) እንደወሰዱ ከ24 ሰዓታት በኋላ ምንም ደም ካልወጣ
- በከባድ መድማት ከቀጠለ
- ከሳምንት በኋላ አሁንም የእርግዝና ምልክቶች ካሉብዎ።

ይህንንም የሚከተሉትን በማነጋገር ማድረግ ይችላሉ፡

- ጽንሰ ማስወረዱ የተካሄደበት ክሊኒክ
- ለአጠቃላይ ህኪም/GP
- በአቅራቢያዎ ያለ ሆስፒታል የድንገተኛ ክፍል ይሆናል።

## የበለጠ መረጃ

ይህ የመረጃ ጽሁፍ በ Health Translations Directory ካሉት ሶስት ጽሁፎች ውስጥ አንዱ ነው። እባክዎ የሚከተሉትንም ይመልከቱ፡

- ጽንሰ ማስወረድ



- የጽንሰ ማስወረድ አሠራር ሂደት- በቀዶ ጥገና

በቪ.ክቶሪያ መንግሥት ሥልጣን ያገኘና የታተመ፤ አድራሻ 1 Treasury Place, Melbourne.

© State of Victoria, የጤና እና ሰብአዊ አገልግሎቶች መምሪያ፤ January 2019.

በድረገጽ <<http://healthtranslations.vic.gov.au/>> ላይ ቀርቧል።