

តើជំងឺហ៊ីតបង្កដោយព្យុះមានផ្ករន្ទះគឺជាអ្វី?

ព្យុះមានផ្ករន្ទះមួយចំនួនអាចបណ្តាលឱ្យគ្រាប់លំអងស្មៅផ្ទុះ បញ្ចេញសារធាតុអាសែហ្សូ ដែលអាចបង្កឱ្យមានការវាយប្រហារ នៃជំងឺហ៊ីត ដែលគេស្គាល់ថាជាជំងឺហ៊ីតបង្កដោយព្យុះមានផ្ករ ន្ទះ។ ទោះបីវាមិនសូវមាន វាអាចកើតឡើងក្នុងរដូវសម្បូរលំអង ស្មៅ (ជាធម្មតានៅចន្លោះខែតុលា និងខែធ្នូ)។

តើអ្នកណាខ្លះមានហានិភ័យ៖

- នរណាដែលមានជំងឺហ៊ីត (បច្ចុប្បន្ន ក្នុងអតីតកាល ឬមិន ទាន់បានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឃើញ)។
- អ្នកណាដែលមានរោគផ្តាសាយតឹងច្រមុះ (Hay fever) ក្នុងរដូវផ្កាវីក។



ដើម្បីទទួលបានការបោះពុម្ពផ្សាយនេះក្នុងទម្រង់ដែលអាចចូលប្រើបាន សូមទូរសព្ទលេខ **1300 761 874** ដោយប្រើសេវាកម្មជាតិផ្នែកប្រាស្រ័យ ទាក់ទងសម្រាប់ជនពិការ **13 36 77** ប្រសិនបើចាំបាច់ ឬផ្ញើអ៊ីមែល **climate.publichealth@health.vic.gov.au**

ត្រូវបានអនុញ្ញាត និងបោះពុម្ពដោយរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋវិចចូរ៉េ 1 Treasury Place, Melbourne ។ © រដ្ឋវិចចូរ៉េ ក្រសួងសុខាភិបាល ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2024។ អាចរកបានពីគេហទំព័រ **<https://www.health.vic.gov.au/about/our-campaigns>**

ISBN 978-1-76131-430-8 (pdf/អនុញ្ញាត/MS word) 2408830



ជំងឺហ៊ឺតបង្កដោយព្យុះមាន ផ្លូវរន្ទះអាចគំរាមកំហែង ដល់អាយុជីវិត

ជំងឺពីហានិភ័យ។ ត្រៀមបម្រុង។ រក្សាឲ្យមានសុវត្ថិភាព។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ [Betterhealth.vic.gov.au/thunderstorm-asthma](https://betterhealth.vic.gov.au/thunderstorm-asthma)



រក្សាឱ្យមានសុវត្ថិភាពក្នុងរដូវលំអងស្មៅ

អ្នកអាចកាត់បន្ថយឱកាសក្នុងការរងផលប៉ះពាល់ដោយ
ជំងឺហ៊ីតបង្កដោយព្យុះមានផ្ការន្ទះ។

ជៀសវាងព្យុះមានផ្ការន្ទះក្នុងរដូវនេះ ជាពិសេសខ្យល់កន្ត្រាក់នា
ពេលមុនព្យុះ។

ចូលក្នុងផ្ទះ បិទទ្វារ និងបង្អួច ហើយបិទម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែល
អាចនាំខ្យល់ពីខាងក្រៅចូល (ឧ. ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែលប្រើប្រព័ន្ធ
បង្អួច)។

ស្វែងយល់ពីជំនួយដំបូងសម្រាប់ជំងឺហ៊ីត ហើយត្រូវឱ្យប្រាកដ
ថាអ្នកយល់ដឹងពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើ ប្រសិនបើអ្នក មិត្តភក្តិ ឬ
សមាជិកគ្រួសារទទួលរងជំងឺហ៊ីត ឬការវាយប្រហារពីជំងឺហ៊ីត។

ពិនិត្យមើលការព្យាករណ៍ជំងឺហ៊ីតបង្កដោយព្យុះមានផ្ការន្ទះ
ជាប្រចាំនៅលើគេហទំព័រ ឬកម្មវិធី VicEmergency app
ហើយរៀបចំ 'តំបន់ឃ្លាំមើល' ដើម្បីទទួលបានឱកាស និងការ
ប្រាប់ឱ្យប្រុងប្រយ័ត្នសម្រាប់តំបន់របស់អ្នក។

ប្រសិនបើអ្នកមានជំងឺហ៊ីត៖

- ទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកឱ្យបានទៀងទាត់ ដើម្បីធានាបាននូវការគ្រប់គ្រងជំងឺហ៊ីតបានល្អ និងបង្កើត ឬពិនិត្យឡើងវិញនូវផែនការចំណាត់ការទប់ទល់ជំងឺហ៊ីតរបស់អ្នក។
- លេបថ្នាំបង្ការរបស់អ្នកតាមការណែនាំ ហើយយកថ្នាំបន្ទូរស្ថានភាពរបស់អ្នកទៅជាមួយគ្រប់ពេល។

ប្រសិនបើអ្នកមានរោគផ្តាសាយតឹងច្រមុះ (Hay fever)៖

- ទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិត ឬឱសថការីរបស់អ្នក ដើម្បីពិភាក្សាអំពីការព្យាបាលដ៏ល្អបំផុតរបស់អ្នក និងហានិភ័យនៃជំងឺហ៊ីតបង្កដោយព្យុះមានផ្ការន្ទះ។
- រៀនអំពីជំនួយដំបូងសម្រាប់ជំងឺហ៊ីត និងដឹងពីកន្លែងដែលអ្នកអាចទទួលបានបំពង់បាញ់ថ្នាំបន្ទុះជំងឺហ៊ីតប្រសិនបើត្រូវការ។ ទាំងនេះអាចរកបានពីឱសថស្ថានដោយមិនបាច់មានវេជ្ជបញ្ជា។

ប្រសិនបើអ្នកគិតថា នរណាម្នាក់កំពុងរង ការវាយប្រហារដោយ ជំងឺហ៊ីត...



ជំហានទី 1 - ដាក់បុគ្គលនោះអង្គុយ
ឱ្យត្រង់។



ជំហានទី 2 - ក្រឡុកបំពង់ហ៊ីតពណ៌ខៀវ /
ពណ៌ប្រផេះ, បាញ់ថ្នាំចូលក្នុងបំពង់ស្រូប
1 ដង, ស្រូបថ្នាំ 4 ឡើងវិញពីបំពង់ស្រូប។
ធ្វើវាឡើងវិញឱ្យបាន 4 ដង។



ជំហានទី 3 - រង់ចាំ 4 នាទី ហើយ
ធ្វើជំហានទី 2 ឡើងវិញ ប្រសិនបើ
ការដកដង្ហើមមិនត្រឡប់មកធម្មតាវិញទេ។



ជំហានទី 4 - ប្រសិនបើការដកដង្ហើមរបស់
បុគ្គលនោះមិនត្រឡប់មកធម្មតាវិញទេ សូម
ទូរសព្ទទៅលេខសូន្យបីដង (000)។ ធ្វើ
ជំហានទី 2 ឡើងវិញរៀងរាល់ 4 នាទី ខណៈ
ដែលអ្នកកំពុងរង់ចាំ។